

FAO LDB	NOME COMERCIAL	AREIRO-QUATRO-MANCHAS (Four-spot megrim)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Lepidorhombus boscii</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Chordata	
		Classe	Actinopterygii	
		Ordem	Pleuronectiformes	
Família		Scophthalmidae		



Fonte: www.ictieterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie demersal que vive sobre sedimentos finos. Encontra-se entre os 7 e os 800m. Reproduz-se de Março a Junho. É uma espécie carnívora, alimentando-se de peixes, crustáceos e moluscos. Pode alcançar os 40cm. Corpo oval e alongado. Lado esquerdo oculado, revestido de escamas ctenoides. Boca grande e mandíbula proeminente. Barbatanas pélvicas alongadas, não reunidas à barbatana anal. Origem da barbatana dorsal mais próxima da extremidade do focinho que do bordo anterior do ano. As barbatanas (dorsal e anal) terminam no lado cedo do pedúnculo caudal. Coloração acastanhada, com quatro manchas negras bem marcadas: duas sobre a porção posterior da barbatana dorsal e as outras duas na porção posterior da barbatana anal.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	20cm
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27); Mar Mediterrâneo (Zona FAO 37)
MÉTODO DE CAPTURA	Redes de arrasto de fundo
MODO DE APRESENTAÇÃO	Pescado fresco e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) nº 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) nº 1441/2007); Critérios químicos: Reg. (CE) nº 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura
PÚBLICO-ALVO	População geral
OBSERVAÇÕES	Espécie sujeita a Totais Admissíveis de Captura (TAC). Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: Biodiversidade nas pescas do Algarve (2007), Ictieterm, Manual Prático de Identificação de Peixes Ósseos da Costa Continental Portuguesa – IPMA (2015), DGRM.